

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 03 del presente año

Mejorando el acceso a tratamientos para las enfermedades tropicales desatendidas en Perú

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reafirma su compromiso de acompañar el esfuerzo de los países para enfrentar estas afecciones que, pese a los avances alcanzados, aún representan un desafío para la salud pública, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el Perú, con la cooperación técnica de la OPS, viene fortaleciendo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades tropicales desatendidas (ETD), teniendo en cuenta un enfoque integral, territorial y centrado en las personas. Las ETD afectan principalmente a comunidades rurales y de difícil acceso, y su control requiere no solo intervenciones sanitarias sostenidas, sino también el trabajo articulado entre los distintos niveles del sistema de salud. En ese contexto, la OPS acompaña al Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y a las direcciones regionales de salud en el diseño e implementación de estrategias que permitan reducir la carga de estas enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población afectada. **Leishmaniasis: avances en el acceso al tratamiento local y oral** La leishmaniasis continúa siendo una de las enfermedades tropicales desatendidas presentes en el país, con un promedio de entre 5 000 a 5 300 casos anuales, según el CDC-Perú. Las regiones de Cajamarca, Madre de Dios, Cusco, Piura, Junín y Amazonas, concentran el mayor número de notificaciones. Ante este escenario, el Perú ha dado un paso significativo al incorporar tratamientos locales y orales, lo que ha permitido ampliar las alternativas terapéuticas disponibles, con tratamientos oportunos, seguros y eficaces para los pacientes. Como parte de este esfuerzo, se realizaron dos donaciones de miltefosina, para el tratamiento oral de pacientes pediátricos, prestando además cooperación técnica para la administración, seguimiento, prevención y cuidados de los niños afectados, fortaleciendo así, la capacidad de respuesta de los servicios de salud en la provincia de Cajabamba – Cajamarca. Asimismo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Cajamarca ha asumido el compromiso de realizar un seguimiento continuo a los pacientes en tratamiento, con el objetivo de asegurar la adherencia y realizar evaluaciones periódicas que aseguren la curación de las lesiones. Este acompañamiento previene complicaciones, reduce recaídas y permite avanzar hacia un mayor control de la enfermedad, garantizando la curación de la leishmaniasis. Una respuesta innovadora para la Teniasis/Cisticercosis La teniasis y cisticercosis por *Taenia solium* (tenia del cerdo) son enfermedades parasitarias altamente endémicas en el Perú. Una de las formas más graves es la neurocisticercosis, que se produce cuando una persona ingiere los huevos de la tenia, estos liberan larvas que migran a través del torrente sanguíneo y se alojan en los músculos y en el sistema nervioso central. Se estima que la infección por este parásito es responsable de alrededor del 30% de los casos de epilepsia en países endémicos. Se calcula que en el Perú existen cerca de 40 000 casos de neurocisticercosis sintomática, según análisis publicados por especialistas en enfermedades infecciosas. En la región Tumbes se registran casos del complejo teniasis/cisticercosis, cuyo abordaje requiere intervenciones interdisciplinarias, específicas y sostenidas para su control y tratamiento. Ante este escenario, la región ha manifestado un marcado interés en fortalecer la atención integral de esta enfermedad, con el acompañamiento técnico de la OPS. La OPS, en coordinación con el Minsa, ha facilitado la distribución de niclosamida para apoyar el tratamiento en las cuatro localidades donde se han identificado casos de teniasis. Este avance se ha fortalecido debido a que la Dirección Regional de Salud (Diresa) Tumbes ha dado un paso relevante al elaborar y aprobar la Resolución Directoral N° 00808-2023-Gobierno Regional Tumbes-DRST-DR, que contempla la implementación de un plan piloto para prevención y control del binomio Teniasis - Cisticercosis. Esta directiva contempla un enfoque comunitario e innovador, que incluye la participación activa del personal de salud en la atención domiciliar de los pacientes, asegurando no solo la entrega del medicamento, sino también el acceso a agua segura durante el tratamiento. Esta estrategia busca mejorar la adherencia terapéutica y reducir la transmisión de la enfermedad en la comunidad. Un compromiso sostenido con las poblaciones más vulnerables Estas experiencias ponen en evidencia la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades del sistema de salud, promover políticas públicas sostenibles y mantener el trabajo articulado para no dejar a nadie atrás. La OPS reafirma su compromiso de seguir acompañando al Perú en el camino hacia la eliminación y el control de las enfermedades tropicales desatendidas, en línea con la Iniciativa de Eliminación 30+ y el enfoque de Una Sola Salud (One Health), contribuyendo a una Región de las Américas más equitativa, saludable y resiliente

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 03 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 03)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026			Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3			
1	MALARIA POR P. VIVAX	415	305	178	898	61.088%	61.09%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	60	82	71	213	14.490%	75.58%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	94	78	40	212	14.422%	90.00%
4	TOS FERINA	25	11	3	39	2.653%	92.65%
5	OFIDISMO	13	12	9	34	2.313%	94.97%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	12	8	13	33	2.245%	97.21%
7	LEPTOSPIROSIS	12	7		19	1.293%	98.50%
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	6	0.408%	98.91%
9	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2	3	0.204%	99.12%
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	3			3	0.204%	99.32%
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA			2	2	0.136%	99.46%
12	HEPATITIS B		1	1	2	0.136%	99.59%
13	SIFILIS MATERNA		2		2	0.136%	99.73%
14	SIFILIS CONGÉNITA		1		1	0.068%	99.80%
15	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	1	0.068%	99.86%
16	LOXOCELISMO		1		1	0.068%	99.93%
17	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	1	0.068%	100.00%
Total general		637	511	322	1470	100%	

Hasta la semana epidemiológica 03 del 2026 se notificaron 17 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, el 75.8 % corresponden a 2 enfermedades principalmente:

- Malaria por *P. vivax* (61.08%)
- Dengue sin signos de Alarma(14.49%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 23 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más frecuentes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 03).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	898	100.00			898
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	8	3.76	205	96.24	213
3	MALARIA P. FALCIPARUM	212	100.00			212
4	TOS FERINA	3	7.69	36	92.31	39
5	OFIDISMO	34	100.00			34
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	5	15.15	28	84.85	33
7	LEPTOSPIROSIS	3	15.79	16	84.21	19
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	6	100.00			6
9	MUERTE MATERNA DIRECTA	3	100.00			3
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	1	33.33	2	66.67	3
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	2	100.00			2
12	HEPATITIS B			2	100.00	2
13	SIFILIS MATERNA	2	100.00			2
14	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
15	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
16	LOXOCELISMO	1	100.00			1
17	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1

Hasta la S.E. 03; 9 de las 17 enfermedades notificadas, reportan 100% de confirmación, así mismo 3 enfermedades se mantienen 100% como casos probables.

Dengue y leptospirosis siendo las enfermedades mas prevalentes en la región Loreto, reporta más del 80% de casos probables en espera de su confirmación. Así mismo, tos ferina que en el 2025 ha presentado brotes en varios distritos de la región, reporta un 92.3% de casos sin confirmar.

En el 2025, en la misma S.E. 03; dengue sin signos de alarma reportó 94.9% de confirmados, mientras que leptospirosis un 54.5%.

MALARIA



Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (244), Pastaza (116), Tigre (95), Yaquerana (94), Napo (88), Trompeteros (88), Yaguas (59), Alto Nanay (54), San Juan Bautista (37), Rosa Panduro (26), Yavari (26), Mazan (21), Pebas (19), Ramon Castilla (16), Teniente Manuel Clavero (14), Barranca (13), Nauta (13), Morona (11), Putumayo (11), Urairinas (10), Iquitos (9), Indiana (8), Soplin (8), Punchana (5), San Pablo (5), Manserique (4), Torres Causana (4), Belen (3), Balsapuerto (2).



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)

Según el nivel de riesgo por México, por la Tasa de Incidencia Acreditada (TIA) en la SE. El Jiro reporta alto dentro de Alta, Mediana y Bajo riesgo. Asimismo, reporta dentro en riesgo bajo en el grupo de niños. Con respecto a los últimos años, se reportó 0 fallecimientos de riesgo.

Se observa un porcentaje bajo de riesgo en la presente semana.

Se reportó número de decesos que no presentan casos de malaria en las provincias de Alt. Arizóna, Chapul y Requena así en datos principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (ver gráfico).

[Learn More About Us](#)



- **Alto Riesgo:** 0 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 01 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 17 Distritos
- **Sin Riesgo:** 37 Distritos.



Hasta la S.E. 03 del presente año, 17 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2020 fueron afectados 28 distritos.

De los 57 distritos que reportan casos, todos muestran disminución de los casos de Dengue en comparación al 2005.

El Distrito acumula el 80.48% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yarinacocha la que concentra la Seta (40.83%), seguido de San Juan Bautista (23.54%). Para el 2025 Yarinacocha también acumula la Seta con el mayor número de casos seguido de Iquitos.

En la presente semana, 14 distritos no reportaron casos que el 2023 si reportaron a la misma semana. Así mismo tres distritos reportan caso este año que en el 2023 no reportaron.





Gráfico de barras mostrando o número de projetos de design para cada tipo de veículo (Carro, Moto, Bateria, Avião, Helicóptero) nos anos 2015 e 2016. O eixo Y representa o número de projetos (0 a 10). O eixo X lista os tipos de veículos. A legenda indica que as barras azuis representam 2015 e as barras laranjas representam 2016.

Veículo	2015	2016
Carro	1	6
Moto	1	5
Bateria	1	5
Avião	2	9
Helicóptero	1	3

Gênero	RPO de Detran			TOTAL	VENCIMENTOS RPOs
	COMISSÃO COM SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO	DETANHO COM RPO POR MÊS DETANHO	DETANHO GRATUITO		
Comissão	10	110	0	120	30,00
Material	10	70	0	80	40,00
TOTAL	20	180	0	200	70,00

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo femenino un mayor porcentaje.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 03) – 2026 (S.E. 01 - 03)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 03; 35 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 6 distritos más en riesgo que la semana anterior y 8 de ellos califican como alto riesgo.

El mayor número de distritos de mediano riesgo se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.


Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 9 distritos más con riesgo de transmisión.

Fuente: Base Notif. CDC-MNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA P vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 - 03)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA			Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1	2	3					
1	ANDOAS	79	56	24	215	159	17.706%	17.71%	-26.05
2	NAPO	36	41	11	24	88	9.800%	27.51%	266.67
3	TIGRE	38	19	29	81	86	9.577%	57.08%	6.17
4	TRAPISEROS	31	26	13	109	70	7.295%	44.88%	-35.78
5	YAGUAYANA	28	22	20	59	70	7.295%	52.67%	18.64
6	PASTAZA	16	31	17	81	94	7.127%	59.80%	4.92
7	YAGUAS	27	14	12	3	33	5.902%	65.70%	1866.67
8	ALTO NAWAY	20	13	12	120	43	4.788%	70.49%	-64.17
9	SAN JUAN BRITISTA	24	8	5	163	17	4.120%	74.81%	-77.16
10	ROSA PANDURO	13	8	5	5	26	2.895%	77.51%	
11	NAVARI	12	7	4	65	23	2.561%	80.07%	-64.62
12	MAZAN	11	9	3	25	21	2.319%	82.41%	-16.06
13	PESAS	17	2	2	45	19	2.116%	84.52%	-57.78
14	RAMÓN CASTILLA	6	5	4	61	15	1.670%	86.19%	-75.41
15	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	4	80	14	1.559%	87.75%	-62.50
16	BARRANCA	3	8	2	75	13	1.448%	89.20%	-62.67
17	NAUTA	6	4	2	20	12	1.358%	90.53%	-40.00
18	MORONA	6	4	1	6	13	1.225%	91.76%	83.33
19	URARINAS	5	3	2	51	10	1.114%	92.87%	-80.39
20	QUITOS		8	1	47	9	1.002%	93.88%	-80.85
21	INDIANA	5	3		21	8	0.891%	94.77%	-61.90
22	SOPLIN	5	3	2	30	8	0.891%	95.66%	-73.33
23	PUTUMAYO	4		4	3	8	0.891%	96.55%	166.67
24	SAN PABLO	4	1		7	5	0.557%	97.10%	-28.57
25	PUNCHANA	4	1		59	5	0.557%	97.66%	-81.33
26	MANSTRICHE	4			84	4	0.445%	98.11%	-95.24
27	TORRES CAUSANA	2	2		5	4	0.445%	98.55%	-20.00
28	BELÉN	2	1		11	3	0.334%	98.89%	-72.73
29	SANTA ROSA DE LORETO			1	1	2	0.223%	99.11%	
30	BALSAPUERTO	1	1		13	2	0.223%	99.35%	-84.62
31	BERNARDO LÓPEZ		2		7	2	0.223%	99.55%	-71.43
32	ALTO TAPICHE			1	1	1	0.111%	99.67%	
33	PURINAGUAS	1			8	1	0.111%	99.78%	-67.50
34	LAS AMAZONAS			1	4	1	0.111%	99.89%	-75.00
35	PARINARI	1			1	1	0.111%	100.00%	
36	IBEROS				3	0	0.000%	100.00%	-100.00
37	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS				1	0	0.000%	100.00%	-100.00
38	JENARO HERRERA				3	0	0.000%	100.00%	-100.00
39	MAQUILA				1	0	0.000%	100.00%	-100.00
40	LAGUNAS				1	0	0.000%	100.00%	-100.00
Total general		415	305	178	1570	898	100%		


Fuente: Base Notif. CDC-MNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 03 del 2026, 35 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que a la misma semana del 2025, 36 distritos reportaron casos de vivax. El 80.07% de casos se concentran en 11 distritos. 11 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 7 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo, 29 distritos reportan disminución en la presente semana.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA			Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3					
1	ANDOAS	35	37	33	78	85	40.09	40.09	7.83%
2	PASTAZA	19	25	8	36	52	24.93	64.62	44.4%
3	YACUTIANA	11	5	8	1	24	11.32	75.94	2300.0%
4	TROMPETEROS	11	3	3	55	17	8.02	83.98	-71.2%
5	ALTO NANAY	2	3	6	14	11	5.19	89.15	-21.4%
6	TIGRE	6	2	1	30	9	4.25	93.40	-70.0%
7	YAGUAS	6				6	2.83	96.23	
8	YAVARI	3			9	3	1.42	97.64	-66.7%
9	PUTUMAYO	1	1	1		3	1.42	99.06	
10	RAMÓN CASTILLA		1		17	1	0.47	99.53	-94.1%
11	NAUTA		1		1	1	0.47	100.00	0.0%
12	URARINAS				28	0	0.00	100.00	-100.0%
13	PUNCHANA				1	0	0.00	100.00	-100.0%
14	PERAS				18	0	0.00	100.00	-100.0%
15	MORONA				2	0	0.00	100.00	-100.0%
16	SAN PABLO				1	0	0.00	100.00	-100.0%
17	SAN JUAN BAUTISTA				1	0	0.00	100.00	-100.0%
18	INDIANA				1	0	0.00	100.00	-100.0%
Total general		94	78	40	298	212	100.00		



Hasta la S.E. 03 del 2026; 11 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum* mientras que a la misma semana del 2025; 16 distritos reportaron casos de falciparum. El 83.96% de casos se concentran en 4 distritos. Los distrito de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 60% de malaria falciparum en la Región. En comparación al 2025; 5 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 3 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 12 distritos reportan disminución a la misma semana.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Edad	MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. falciparum</i>	<i>P. vivax</i>		
0-11 Años (Niños)	85	368	453	40.8%
12-17 Años (Adolescente)	34	126	160	14.4%
18-29 Años (Joven)	36	154	190	17.1%
30-59 Años (Adulto)	49	219	268	24.1%
60 + (Adulto Mayor)	8	31	39	3.5%
TOTAL	212	898	1110	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (40.8%), lo cual demuestra transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 24.1%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo.

SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. falciparum</i>	<i>P. vivax</i>		
Femenino	106	362	468	42.2%
Masculino	106	536	642	57.8%
TOTAL	212	898	1110	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 57.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		4	4
2	HOSPITAL III IQUITOS		3	3
3	CLINICA NAVAL		2	2
4	SAN LORENZO	1		1
5	HOSPITAL APOYO IQUITOS		1	1
Total general		1	10	11

Hasta la Semana 03; se reportó 11 hospitalizados por malaria, 6 hospitalizado más que la semana anterior (02). El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 4 pacientes. El hospital de EsSalud de Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados. No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 03

Hasta la S.E.03; 8 establecimientos de salud reportaron 32 casos hospitalizados de los cuales 5 fueron confirmados. Con respecto a la semana anterior (SE 02) se notificó 18 (128.6%) hospitalizados más en la presente semana. El Hospital Apoyo Yurimaguas y el Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados. No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó un fallecido a la misma semana.


N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	9	1	0	10
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	0	0	7
3	SAN LORENZO	7	0	0	7
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	2	1	0	3
5	HOSPITAL III IQUITOS	2	0	0	2
6	SANTA ROSA DE RAMÓN CASTILLA	1	0	0	1
7	CONTAMANA	1	0	0	1
8	SARAMIRIZA	1	0	0	1
Total general		30	2	0	32

En la S.E. 03; los Hospitalizados por casos de Dengue fueron de la etapa de Adulto con 10(31.3%) casos.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	Total general
0-11 Años (Niños)	5	0	0	5
12-17 Años (Adolescente)	3	0	0	3
18-29 Años (Joven)	8	1	0	9
30-59 Años (Adulto)	10	0	0	10
60 + (Adulto Mayor)	4	1	0	5
Total general	30	2	0	32

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 03) – 2026 (S.E. 01 - 03)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que en la S.E. 03, 17 distritos están en **bajo riesgo** de transmisión de dengue.

El 70.4% (37) de distritos, en la presente semana no reportaron casos de dengue

El mayor número de distritos de **mediano riesgo** se ubican en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

Hasta esta semana no se reportaron distritos de **alto riesgo** de transmisión de dengue, en comparación del 2025 donde 16 distritos fueron notificados de alto riesgo epidemiológico, de los 30 que fueron reportados con riesgo de transmisión.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 46- 2025 - SE03-2026. (CORTE 24.01.2026)



Fuente: GERESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv 2

El índice de Positividad, reportado según la fecha de publicación de resultados, muestra una tendencia a la baja. Pasó del 13.6% en la SE 01 (89/14) al 5.4% en la SE 03 (53/3).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 – SE 03 (CORTE 24.01.2026)



Fuente: GERESA Loreto CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv 2

Hasta la SE 03 - 2026 se procesaron 239 pruebas en el laboratorio. De estas, 30 correspondieron a IgM (6 positivo) y 209 a NS1 (8 positivos), de acuerdo con el tipo de prueba realizada.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE03- 2026. (CORTE 24.01.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	4	7	11	63.64	11
DATUM DEL MARAÑON	0	2	2	100.00	2
MAYNAS	2	3	5	60.00	5
Total	6	12	33.33	66.67	18

Fuente: REDISA Loreto - CPS, Laboratorio de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología - Nelsa J. P.

Hasta la SE 03-2026 se reportaron un total de **18 resultados positivos**, distribuidos de la siguiente manera: **11 en la provincia de Alto Amazonas (7 por NS1 y 4 por IgM)**, **5 casos en Maynas (2 por IgM y 3 por NS1)** y **2 casos (NS1) en Datem del marañon**.


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORRED Y EESS. SE03-2026. (CORTE 24.01.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
SE 03	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	2	1	3	
	Total BARRANCA		2	1	3	
	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	1	2	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4	4	8	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	3	6	
	Total BELEN		8	8	16	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	3	3	6	
	Total IQUITOS NORTE		3	3	6	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	7	1	8	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1	1	2	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	1	2	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1	1	2	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3	1	4	
	Total IQUITOS SUR		13	2	15	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORRED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	9	9	18	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	9	9	18	
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	1	1	2	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	1	1	2	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	3	3	6	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORRED		23	23	46	
	PUNCHANA	00000022 - PUESTO DE SALUD PICURO YACU	1	1	2	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	2	2	4	
	Total PUNCHANA		3	3	6	
	SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	1	1	2	
	Total SANTA CLOTILDE		1	1	2	
	Total general		53	3	56	5.4%

En la SE 03 del 2026, se han reportado un total de 56 muestras, **3 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 5.4 %.


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE03.2026 (CORTE: 24/01/2026)

Corte: SE03.2026
25.4% DENV-1 21.9% DENV-2 52.4% DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) SE01 del año 2026, se registró la **predominancia sostenida del serotipo DENV-3**, representando el 52.4% de los casos acumulados. El DENV-1 y DENV-2 mantuvieron descensos leves con 25.4% y 21.9%, respectivamente. De la SE41 a la SE01 del 2026, se presenta la transmisión sostenida del serotipo Denv-3 en 5 distritos, predominando en Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas, seguido de Manseriche y Barranca de la provincia del Datem del Marañon y los distritos de San Juan Bautista y Belén de la provincia de Maynas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 2025 – SE03 DEL 2026 (CORTE: 24/01/2026)



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE45 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	8	304	0	312
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	1	0	7
	BARRANCA	0	31	32	0	63
	MANSERICHE	0	3	6	0	9
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	7	6	2	0	15
	TROMPETEROS	0	1	1	0	2
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	13	0	138
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IKUITOS	32	36	34	0	102
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	36	29	6	0	71
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	40	1	91
	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
REQUENA	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		227	195	467	3	892

DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS ÚLTIMAS 5 SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS SE48 – SE03 DEL 2026 (CORTE 24/01/2026)


Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE41	00000025- CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	0	1	1
	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	3	3
	00000228- C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00011409- HOSPITAL III IQUITOS	0	0	1	0	1
SE42	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
	00000235- C.S. I-4 SAN LORENZO	0	0	0	1	1
	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	0	3	4
	00000228- C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
SE43	00000211- CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	0	1	1
	00000235- C.S. I-4 SAN LORENZO	0	0	0	2	2
	00000246- SARAPIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
SE44	00000261- CENTRO DE SALUD NAUTA - NÚCLEO BASE	0	1	0	0	1
	00000211- CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	0	1	1
	00000228- C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	0	0	3	4
	00000246- SARAPIRIZA	0	0	0	2	2
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
SE45	00000224- C.S. I-3 LONRA	0	0	0	1	1
	00000228- C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00000246- SARAPIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00000051- CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	0	0	0	1	1
SE46	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	0	2	3
	00000224- C.S. I-3 LONRA	0	0	0	1	1
	00000246- SARAPIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	0	1	2
SE47	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	2	2
	00000228- C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00000246- SARAPIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00000051- CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	0	0	0	1	1
SE48	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	0	2	3
	00000224- C.S. I-3 LONRA	0	0	0	1	1
	00000246- SARAPIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	0	1	2
SE49	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	2	2
	00000228- C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00011386- CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	0	0	1	1
	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	4	4
SE50	00000228- C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	4	4
	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	2	2
	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
	00010274- ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	3	3
	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
SE51	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	2	2
	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	4	4
	00000210- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
	00007326- P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00000211- CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	0	1	1
Total general		4	1	1	65	71

En las semanas epidemiológicas SE41-SE53 del 2025 hasta la SE01 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3. Predominando en la provincia de Alto Amazonas. Los casos provienen principalmente de los hospitales ESSALUD – Hospital I Yurimaguas y Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.
SE01 – SE50 DEL 2025 (actualizado al 05/01/2026)



2024



2025 (SE48)

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte SE01:
24/01/2026

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 50/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-40-2025>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 24.01.2026.) SE 01 – SE 03 2026

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		YURIMAGUAS	1
Total general			6

Fuente: NetLabv1, (MAYARO, OROPUCHE).

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
Total 2025			3
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		YURIMAGUAS	1
Total 2026			4
Total general			7

En la SE 03–2026 se publica los resultados **Negativos** para el diagnostico diferencial por oropuche

Desde la SE 01 hasta la SE 03 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **7 resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropuche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: zika y CHIKUNGUNYA (CORTE 24.01.2026.) SE 01 – SE 03 2026


Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
Total general			54	54

- De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 03-2026, y en el marco de la vigilancia y diagnóstico diferencial, se cuenta con reportes correspondientes al periodo de la SE 50 a la SE 53 del 2025. Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika (n=27) y Chikungunya (n=27), haciendo un total de **54 resultados reportados**.
- Hasta la SE 03 2026, no se tiene reporte para fiebre amarilla

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 al 26 de Enero 2026)


Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.9%, Iquitos con 70%, Belén con 73.2%, San Juan con 65.9%. Con una cobertura de avance de 21.9% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	%	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Residentes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuevientes	Total	N° Residentes	% Insp	% Cert.	% Desh.	% Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12-25/01/2026	21067	34.4%	7244	2195	1935	618	278	10075	26523	71.9	19.2	6.1	2.8	1134	2015	15.7	27.8
IQUITOS	7 al 19	12-26/01/2026	36307	19.8%	7203	3335	2237	478	374	10287	26590	70.0	21.7	4.6	3.6	1130	1871	15.7	26.0
BELÉN	20 al 25	16-25/01/2026	18312	38.4%	7031	2741	1955	460	158	9604	24889	73.2	28.4	4.8	1.6	975	1742	13.3	24.8
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13-26/01/2026	35482	8.2%	2902	859	1173	293	37	4405	9233	65.9	26.6	6.7	0.8	667	1211	23.0	41.7
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12-26/01/2026	111368	21.9%	24888	9130	7100	1849	847	34376	90235	70.9	21.2	5.4	2.5	3906	6889	16.8	28.1



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 03)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO.
AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 3)



Hasta la S.E. 03 del 2026; se reportó 19 casos de Leptospirosis, 9 casos más que la semana anterior (02).

En comparación al 2025, hasta la semana 03 se observa una disminución de los casos 427 (95.7%) casos menos de leptospirosis.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 03 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **ÉXITO** del canal endémico, con tendencia a disminuir.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 03) - 2026 (S.E. 01 - 03)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 03; 6 distritos están en **bajo riesgo** de transmisión de Leptospirosis.

El 88.9% (48) de los distritos en la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 10 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica			Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3					
1	BELÉN	6	4		75	10	52.63%	52.6%	↓ -87%
2	YURIMAGUAS	3			61	3	15.79%	68.4%	↓ -95%
3	SAN JUAN BAPTISTA		2		80	2	10.53%	78.9%	↓ -98%
4	PUNCHANA	1	1		58	2	10.53%	89.5%	↓ -97%
5	URARINAS	1				1	5.26%	94.7%	
6	QUITOS	1			59	1	5.26%	100.0%	↓ -98%
7	NAUTA				64	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
8	MORONA				1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
9	FERNANDO LORES				1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
10	BALSAPUERTO				2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
11	NAPO				1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
12	CAHUAPANAS				1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
13	PUJINAHUA				3	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
14	CONTAMANA				2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
15	REQUENA				4	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
16	JENARO HERRERA				17	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
17	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
18	LAGUNAS				7	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
19	YAQUERANA				1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
20	MAQUIA				1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
21	ALTO NANAY				4	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
22	MAZAN				1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
TOTAL		12	7	0	446	19	100%		

Hasta la S.E. 03; 6 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 21 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran disminución en comparación al año 2025 en la misma semana epidemiológica.

Hasta la semana 3 se notificaron 427(95.7%) casos menos con respecto al 2025.

El 78.9% de casos se concentran en 3 distritos: Belén, Yurimaguas y San Juan Bautista.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

16 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 si reportaron a la misma semana.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC: Dirección de Epidemiología 2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 03 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1.4	0	0.0	11	15.7	12	17.1
2	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	11	15.7	11	15.7
3	HOSPITAL APOYO QUITOS	0	0.0	0	0.0	10	14.3	10	14.3
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	2	2.9	0	0.0	3	4.3	5	7.1
5	C.S. CARDOZO	0	0.0	1	1.4	4	5.7	5	7.1
6	C.S. MORONACOA	0	0.0	0	0.0	5	7.1	5	7.1
7	C.S. EL ESTRECHO	1	1.4	1	1.4	2	2.9	4	5.7
8	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	2	2.9	0	0.0	1	1.4	3	4.3
9	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	1.4	0	0.0	2	2.9	3	4.3
10	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
11	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
12	P.S. MASUSA	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
13	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
14	P.S. PROGRESO	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
15	P.S. PICURO YACU	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
16	C.S. BELÉN	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
17	P.S. LOS DELFINES	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
18	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
TOTAL GENERAL		7	10.0	3	4.3	60	85.7	70	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 03 2026 ingresaron 70 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 10.0% fueron REACTIVAS y el 4.3% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 85.7% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS San Juan, ESSALUD (11) y el Hospital Apoyo Iquitos (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS san Juan (12) y ESSALUD (11).


RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 03 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	BELEN	3	4.3	1	1.4	18	25.7	22	31.4
2	SAN JUAN	2	2.9	1	1.4	16	22.9	19	27.1
3	IQUITOS	0	0.0	0	0.0	14	20.0	14	20.0
4	PUNCHANA	0	0.0	0	0.0	5	7.1	5	7.1
5	PUTUMAYO	1	1.4	1	1.4	2	2.9	4	5.7
6	TIGRE	1	1.4	0	0.0	1	1.4	2	2.9
7	NAUTA	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
8	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
9	MAZAN	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
TOTAL GENERAL		7	10.0	3	4.3	60	85.7	70	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – URR-2026

- ✓ En la S.E. 03 2026 ingresaron 70 muestras de suero, obtenidas en 09 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **10.0%** fueron REACTIVAS y el **4.3%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (**85.7%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Belén (18) y San Juan (16).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Belén (03) y San Juan (02).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Belén (22) y San Juan (19).


Número de Muertes Maternas según **OCURRENCIAS** y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 28 de enero).



Fuente: Base NoB. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 28 de enero 2026:
a) Se han notificado **03MM**, **Directas (03) e indirectas (0)**, ocurridas en la **región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas **Directas**, **Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 28 de enero).



Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 28 Enero).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	0	0	0	0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	1	0	1	33.3
Puerperio	2	0	2	66.7
Total	3	0	3	100.0

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas están ocurriendo durante el **Puerperio** (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto).
En el 2025: El 67.6% fueron en el puerperio.
En el 2026: El **66.7%** (2) durante el **puerperio** y el 33.3% (1) en el parto.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026


SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 03

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	3	33.33		
2	INMATURIDAD EXTREMA			2	50.00
3	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	25.00
4	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	1	11.11		
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	25.00
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	1	11.11		
7	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	11.11		
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIO	1	11.11		
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	11.11		
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	11.11		
Total		9	100	4	100

Hasta la S.E. 03 se notifico 13 casos de muertes fetales y neonatales, siendo la causa básica con mayor frecuencia Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales inmadurez extrema fue para los neonatales.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica			Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3				
1	LAS AMAZONAS		2	2	4	11.76	11.76	
2	PASTAZA	3			3	8.82	20.59	
3	BELÉN	2	1		3	8.82	29.41	
4	MAZAN	1	1		2	5.88	35.29	
5	TORRES CAUSANA		1	2	3	5.88	41.18	
6	CONTAMANA	1	1		2	5.88	47.06	
7	PEBAS	2			2	5.88	52.94	
8	YURIMAGUAS		1		1	2.94	55.88	
9	TIGRE			1	1	2.94	58.82	
10	SAQUENA		1		1	2.94	61.76	
11	NAUTA			1	1	2.94	64.71	
12	URARINAS			1	1	2.94	67.65	
13	PADRE MARQUEZ		1		1	2.94	70.59	
14	SANTA CRUZ			1	1	2.94	73.53	
15	CAHUAPANKAS		1		1	2.94	76.47	
16	SOPUN			1	1	2.94	79.41	
17	ANDOAS			1	1	2.94	82.35	
18	JENARO HERRERA		1		1	2.94	85.29	
19	PUNCHANA		1		1	2.94	88.24	
20	YAVARI	1			1	2.94	91.18	
21	RAMON CASTILLA	1			1	2.94	94.12	
22	MORONA	1			1	2.94	97.06	
23	SAN PABLO	1			1	2.94	100.00	
Total general		13	12	9	34	100.00		0

Hasta la S.E. 03; 23 distritos han reportado 34 casos de ofidismo, 12 casos mas que la semana anterior (SE 02); los distritos de Amazonas, Pastaza y Belén son los que presentaron el mayor número de accidente ofídicos. El 79.41% de los casos se presento en 16 distritos de los 23 que notificaron.

En la presente semana no se reportó fallecidos por ofidismo.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 03

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica			Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1	2	3					
1	YURIMAGUAS	2	7	2		11	28.21%		
2	URARINAS	7	1			8	20.51%		
3	ANDOAS	6				6	15.38%		
4	PUNCHANA	2		1	13	3	7.69%	↓	-77%
5	CAHUAPANAS	2	1			3	7.69%		
6	JEBEROS	2	1			3	7.69%		
7	RAMON CASTILLA	2				2	5.13%		
8	BALSAPUERTO	1	1			2	5.13%		
9	BARRANCA	1			2	1	2.56%	↓	-50%
10	SAN JUAN BAUTISTA				1	0	0.00%	↓	-100%
11	MORONA				68	0	0.00%	↓	-100%
12	PASTAZA				54	0	0.00%	↓	-100%
13	IQUITOS				6	0	0.00%	↓	-100%
14	LAS AMAZONAS				1	0	0.00%	↓	-100%
15	MANSERICHE				5	0	0.00%	↓	-100%
Total general		25	11	3	150	39	100%		

Fuente: Noti sp. 2026

Hasta la S.E. 03; se han reportado 39 casos de Tosferina, 8 casos más que la anterior semana (S.E. 02), de estos casos notificados, 36 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Yurimaguas muestra un incremento en lo que va del año. Yurimaguas, Urarinas y Andoas reportan mas del 60%de casos de la región.

En comparación al 2025 se notificó 111 casos menos en el presente año. 7 distritos reportan casos que el 2025 a la misma semana no presentaron así mismo 6 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 9 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 03

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	19	15	34	87.2%
12-17 Años (Adolescente)	2		2	5.1%
18-29 Años (Joven)	1	2	3	7.7%
Total	22	17	39	100%



56.4% (22)





43.6% (17)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (87.2%). los casos fueron mayores en el sexo femenino con el 56.4%.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Fuente: Noti sp. 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 03, se han reportado 6 147 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 315 (5.1%) en niños menores de 2 meses; 1 709 (27.8%) en niños de 2 a 11 meses y 4 123 (67.1%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2136 casos más que la semana anterior (SE 02). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas semanas ha mostrado un descenso ubicándose en zona de ÉXITO en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de bajo mediano(4) y bajo (48) riesgo.

Yurimaguas (671), Punchana (524), San Juan Bautista (371), Barranca (328), Iquitos (306), Contamana (268), Andoas (263), Balsapuerto (236), Manseriche (185), Nauta (181), Morona (175), Pastaza (175), Ramon Castilla (167), Uruarinas (163), Tigre (160), Belén (158), Cahuapanas (143), Requena (136), Napo (115), Trompeteros (109), Fernando Loes (95), Lagunas (94), Puinahua (92), Mazan (78).

T.I.A Regional es 528.41 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 03).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos


Mediano Riesgo: 04 4 Distritos

Bajo Riesgo: 48 Distritos

Sin Riesgo: 02 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 22.11% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E. 03 se han registrado 179 episodios de Neumonía; 136 (83.3%) son episodios de Neumonía y 43 (16.7%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 63 casos más que la semana anterior (SE02). Desde hace 4 semanas la curva de casos estuvo en descenso, pero se mantiene en **ZONA DE EPIDEMIA** con tendencia a que continúe disminuyendo. Se han reportado 3 defunciones en lo que va del año, todas intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas(1) y Yurimaguas(1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo(24) y sin riesgo que son la mayoría(30)

Yurimaguas (23), Andoas (21), Punchana (20), San Juan Bautista (18), Barranca (17), Belén (15), Balsapuerto (10), Requena (9), Cahuapanas (8), Napo (8) Nauta (7), Iquitos (6), Pastaza (4), Morona (2), Teniente Cesar Lopez Rojas (2), Contamana (1), Indiana (1), Jeberos (1), Manseriche (1), Pebas (1), Ramon Castilla (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Vargas Guerra (1).

La T.I.A Regional es 1.54% x 1000 .A es como sigue: (S.E. 03)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).

Bajo Riesgo: 24 Distritos

Sin Riesgo: 30 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 32.96% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 03; se han notificado 377 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 234 (62.1%) episodios en niños menores de 2 años y 143 (37.9%) en niños de 2 a 4 años, 94 casos más que la semana anterior (SE 02). En la actual semana el canal endémico la curva de casos se ubica en zona de ÉXITO mostrando un descenso en las últimas tres semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo(11), mientras que la mayoría no presentan riesgo (43).

San Juan Bautista (97), Iquitos (72), Punchana (65), Belén (58), Requena (37), Yurimaguas (29), Andoas (11), Puinahua (5), Lagunas (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Uruarinas (1).

T.I.A Regional es 3.24 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito

Mediano Riesgo: 0 Distrito

Bajo Riesgo: 11 Distritos

Sin Riesgo: 43 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 77.45% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 03, se han notificado 210 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 15 (7.1%) atenciones corresponden a <1 año, 53 (25.2%) atenciones de 1 a 4 años y 142 (67.7%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 89 casos más que la semana anterior (SE 02). La curva de casos continúa con su descenso desde las últimas 4 semanas ubicándose la curva de casos en zona de ÉXITO. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de mediano riesgo(1), bajo riesgo (33) y sin riesgo(20).

Nauta (25), Teniente Manuel Clavero (24), Andoas (21), Contamana (18), Manseriche (11), Ramon Castilla (10), Barranca (9), Sarayacu (9), Cahuapanas (8), Indiana (8), Morona (8), Napo (8), Pastaza (6), Santa Rosa De Loreto (5), Balsapuerto (4), Las Amazonas (4), Torres Causana (4), Urarinas (4), Padre Marquez (3), Soplin (3), Belén (2), Iquitos (2), San Juan Bautista (2), Yavari (2), Alto Nanay (1), Mazan (1), Pampa Hermosa (1), Punchana (1), Putumayo (1), Rosa Panduro (1), Santa Cruz (1), Tapiche (1), Tigre (1), Yurimaguas (1).

La T.I.A Regional es 0.20% x 1000 hab. (S.E. 03) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distrito

Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 20 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.33 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 03 se reportaron 4 708 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 380 (8.1%) atenciones en menores de 01 año, 1 338 (28.4%) atenciones de 01 a 04 años, y 2 990 (63.5%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1712 (57.1%) casos más que la semana anterior (02). La curva de los casos de EDA Acuosa la presente semana reportó un descenso ingresando la curva de casos a zona de ALARMA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026. Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican de alto riesgo (1), Mediano riesgo (3), bajo riesgo (49).

Perteneciente al distrito de Punchana (523), San Juan Bautista (493), Iquitos (458), Contamana (293), Yurimaguas (271), Belén (198), Urarinas (170), Barranca (166), Andoas (156), Morona (136), Cahuapanas (120), Manseriche (119), Nauta (96), Trompeteros (94), Fernando Lores (93), Teniente Manuel Clavero (86), Tigre (86), Putumayo (79), Balsapuerto (78), Ramon Castilla (74), Pastaza (72), Indiana (64), Lagunas (59), Requena (59), Napo (58), Pebas (52).

La T.I.A Regional es 4.40% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 01 Distritos

Mediano Riesgo: 03 Distritos

Bajo Riesgo: 49 Distritos

Sin Riesgo: 01 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 35.51% del total Regional.