

1. La organización mundial de la salud ratifica la importancia de la actividad física y la considera como el factor que interviene en el estado de salud de las personas y la define como la principal estrategia en prevención de la ...
A. morbilidad. C. letalidad.
B. obesidad. D. mortalidad.
2. En un establecimiento de salud I-4 el médico jefe debe elaborar el que es una herramienta de gestión que considera las actividades para la implementación del plan operativo institucional.
A. Plan de abastecimiento e inversiones C. Cuadro multianual de necesidades
B. Plan estratégico institucional D. Plan de salud local
3. Personal de salud, realiza sesión educativa en el establecimiento e identifica a mujer con vida sexual activa, que desde hace un año no usa método anticonceptivo, la refiere a consultorio de PPFF, donde opta por un método. ¿Cuál es la definición operacional para su registro en el HIS?
A. Usuaría captada C. Charla informativa
B. Atención en PPFF D. Consejería en PPFF
4. Dentro del paquete integral de salud adulto mujer. ¿Qué atenciones preventivas se realizan?
A. Despistaje de Sífilis, VIH/SIDA, cáncer de cérvix
B. Atención de violencia familiar
C. Tratamiento de algún daño prevalente
D. Identificación de síndrome de maltrato
5. Al realizar la visita de seguimiento a una gestante de 28 años de edad, relata que su esposo la dopa y abusa sexualmente, por lo que el embarazo es no deseado, pide confidencialidad no comentar con otros profesionales de la salud por sentir vergüenza. Si la intervención es multidisciplinaria. ¿Qué acciones se debe tener en cuenta para respetar el derecho a la confidencialidad?
A. Coordinar acciones conjuntas para el acompañamiento y protección
B. Prevención de enfermedades de transmisión sexual
C. Derivar a psicología para atención en salud mental
D. Derivar a un establecimiento de salud de mayor complejidad
6. En la comunidad rural donde realiza su SERUMS varios moradores reportan el hallazgo de muerte y enfermedad inusuales en cuyes y ratas de campo, por lo que debe proceder a la notificación respectiva. ¿Cuál es el acontecimiento epidemiológico presentado?
A. Zoonosis C. Epizootia
B. Endemia animal D. Brote infeccioso
7. En el centro de salud del primer nivel de atención, se esta llevando a cabo, pruebas de tamizaje de enfermedades venereas. Dicha estrategia corresponde al nivel de prevención:
A. Primaria C. Terciaria
B. Cuaternaria D. Secundaria

8. Adolescente de 13 años, con 38 semanas de gestación, migrante de los andes, sin control, indica relaciones sexuales han sido voluntaria con ex pareja de 35 años, viene acompañada de madre al establecimiento I-3 ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Comunicar a las autoridades, como código violeta y referencia hospitalaria
 - B. Responsabilizar a sus progenitores por negligencia hacia la paciente
 - C. Aplicar kits completos de emergencia para descarte de ITS, VIH, Hepatitis B
 - D. Brindar actividades socio educativas a fin de que paciente identifique riesgos
9. Varón de 35 años acude al establecimiento de salud para evaluación médica. Durante la consulta refiere que presenta tos y flema desde hace 15 días. Según la Norma Técnica de salud para la prevención y control de tuberculosis. ¿Cómo se denomina a un paciente con esta sintomatología?
- A. Paciente con infección latente por tuberculosis
 - B. Sintomático respiratorio examinado
 - C. Sintomático respiratorio
 - D. Paciente con tuberculosis sensible
10. ¿Cuál es una vacuna multidosis, indicada a partir de los 15 meses hasta los 59 años?
- A. BCG
 - B. Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR)
 - C. Antiamarílica (AMA)
 - D. Tétano y Difteria (DT)
11. En estudios clínicos y epidemiológicos, la medición de variables que incluyen la perspectiva del paciente con referencia a resultados relacionados a su calidad de vida. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos más indicados?
- A. Entrevistas y cuestionarios
 - B. Observación directa e indirecta
 - C. Registro por el paciente y familiar
 - D. Registros y documentos ya existentes
12. Un médico serumista se encuentra trabajando en un centro de salud de 12 horas, al cual acude una gestante de bajo riesgo obstétrico con contracciones. ¿A qué establecimiento de salud le corresponde referir?
- A. II - 1
 - B. III - 1
 - C. I - 3
 - D. I - 4
13. El responsable de la RIS desea saber la cantidad de atenciones realizadas por el médico serumista en consulta externa. ¿Qué indicador de gestión debe utilizar?
- A. Rendimiento
 - B. Productividad
 - C. Permanencia
 - D. Concentración

14. El pueblo de Coronilla, están experimentando una contaminación ambiental por derrame de petróleo en un lago circundante a la población, la enfermera encargada de la posta de salud prioriza la etiqueta diagnóstica de "Gestión ineficaz de salud comunitaria". ¿Qué intervención NIC es prioritario?
- A. Colaboración con otros profesionales sanitarios
 - B. Favorecimiento de la resiliencia: comunidad
 - C. Desarrollo de la salud de la comunidad**
 - D. Manejo ambiental: comunidad
15. La infección de un ciudadano por el virus del dengue y el desenlace en muerte, corresponde a la historia natural de la enfermedad. Considerando este concepto, la es un momento importante en el conocimiento de la enfermedad.
- A. vacunación**
 - B. aparición de síntomas
 - C. investigación
 - D. promoción de la salud
16. En la evaluación de una gestante se evidencia úlcera indurada e indolora (chancro) localizada en mucosa genital. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se encuentra?
- A. Clínica**
 - B. Subclínica
 - C. Inducción
 - D. Resolutiva
17. Si la interacción entre un paciente y el personal sanitario tratante, se da mediante uso de las TICs, ¿Qué concepto de salud se está aplicando?
- A. Salud intercultural
 - B. Promoviendo salud
 - C. Cuidado integral
 - D. Telesalud**
18. Melissa gestante adolescente de 14 años acude al Cs Huáscar para colocarse sus dosis de vacunas indicando a la enfermera que no presenta antecedente de antidiftérica. ¿Cuál es el trimestre de vacunación que le corresponde?
- A. II trimestre**
 - B. I trimestre
 - C. VI trimestre
 - D. III trimestre
19. Cuando un niño menor de 5 años con diagnóstico de enfermería de Organización del desarrollo infantil deteriorado está en control del servicio de CRED, la priorización de resultados NOC e intervención NIC es:
- A. Desarrollo infantil: 5 años - Manejo ambiental: seguridad
 - B. Conocimiento: conducta de salud - Enseñanza: seguridad del niño
 - C. Conocimiento: manejo del TDAH – Enseñanza: desarrollo en la primera infancia**
 - D. Desempeño de rol de padres niño pequeño – Favorecimiento del rol parental
20. Paciente migrante gestante quechua hablante, tiene derecho a para parto vertical
- A. Presencia solo de pareja
 - B. Servicios de salud con adecuación cultural**
 - C. Traductor de idioma original
 - D. Acompañamiento de familia

21. El enfermero ubicado en un centro asistencial comunitario de salud mental, está liderando el programa "TaytaWuasi" en el centro poblado Huaycarán, ha iniciado un plan de acción "Intervención familiar para influir positivamente" ¿Qué actividad realizó primero para este plan?
- A. Identificar puntos fuertes en los recursos dentro de la familia
 - B. Ver que los familiares sean expertos en el cuidado de su paciente
 - C. Fomentar la toma de decisiones familiares en el plan de cuidado
 - D. Establecer una relación de confianza con los miembros familiares**
22. En la lucha contra la anemia, se realiza el dosaje de hemoglobina a los 6 meses de nacido, para determinar si tiene anemia. Si es positivo se inicia el tratamiento ...
- A. promocional.
 - B. recuperativo.**
 - C. profiláctico.
 - D. preventivo.
23. Los pobladores de una comunidad ashaninka llegan al centro de salud preocupados debido a que sus niños presentan dolor y diarrea con mucha frecuencia. Además, refieren que tomaron preparados de hierbas y posteriormente algunos fallecieron. ¿Cuál es la función de salud pública que debe fortalecer el personal de salud?
- A. Vigilancia y valoración por el laboratorio
 - B. Valoración del estado de salud
 - C. Valoración clínica y laboratorio
 - D. Vigilancia y valoración del estado de salud**
24. En un caserío de Pasco, se presentan 5 casos de la enfermedad de pertussis durante los meses de enero y febrero. Como jefe de establecimiento. ¿Qué actividades dispone realizar?
- A. Complementarias de vacunación**
 - B. Vacunación regular
 - C. Desinfección en comunidad
 - D. Control de vectores
25. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
- A. Presupuesto por resultados
 - C. Plan operativo**
 - B. Plan de salud local
 - D. Plan estratégico
26. Ud. es jefe de un establecimiento I-4 en la región norte del país y los boletines informativos de epidemiología indican un aumento de casos de melanomas por exposición a rayos UV en el último año. ¿A qué tipo de casos corresponden?
- A. Incidentes**
 - B. Reincidentes
 - C. Probables
 - D. Prevalentes
27. A un establecimiento de salud, llegan 25 niños beneficiarios del programa de alimentación escolar, por presentar cuadro de intoxicación alimentaria, luego del consumir el desayuno escolar. Este tipo de evento debe ser notificado y corresponde a:
- A. Endemia
 - C. Brote**
 - B. Epizootia
 - D. Pandemia

28. En un pueblo amazónico se está implementando una RIS de manera ordenada, siguiendo la normativa del MINSA, considerando su realidad local. ¿Qué característica del proceso se está cumpliendo?
- A. Progresivo
B. Sostenible
C. Planificado
D. Sistemático
29. El fortalecimiento de capacidades del personal de salud para mejorar la calidad en un servicio específico de atención primaria de salud, es una actividad acorde al objetivo de planeamiento estratégico relacionado a ...
- A. fortalecer el ejercicio de la rectoría de la autoridad nacional de salud.
B. mejorar asignación de presupuesto para atención integral.
C. incrementar el acceso a atención integral de salud.
D. difundir la importancia de la salud como derecho.
30. La autoridad regional de salud está implementando la estrategia de Salud Familiar para que se pueda desarrollar efectivamente en el siguiente año. ¿En qué plan institucional se debe programar?
- A. Contingencia
B. Continuidad
C. Operativo
D. Estratégico
31. Durante la campaña de vacunación se interviene a las Instituciones Educativas a fin de vacunar a los niños y niñas con la vacuna de VPH para protegerlos y prevenir el cáncer cervical. ¿Desde qué edad se puede vacunar y cuantas dosis se debe aplicar?
- A. 9 años y dos dosis
B. 13 años y dosis única
C. 11 años y dosis única
D. 9 años y dosis única
32. Mujer de 25 años con diagnóstico de TB pulmonar, es evaluada por especialista quien le detecta que presenta resistencia a la Isoniacida y a la Rifampicina. ¿Cómo se denomina a la tuberculosis que presenta resistencia a ambos fármacos?
- A. Extensamente resistente
B. Multidrogorresistente
C. Sensible
D. Pre- extensamente resistente
33. Personal de salud de P.S. I-1, se dispone a transportar una muestra para despistaje de TBC hacia el hospital, según el documento técnico para el transporte seguro de sustancias infecciosas, la muestra debe almacenarse en:
- A. Contenedor de plástico hermético
B. Contenedor de metal
C. Cooler resistente
D. Placa petri recubierta
34. Disminucion de la tolerancia ala actividad,carga excesiva de fatiga,recuperacion quirurgica deteriorada aque dominio pertenece?
- A. Dominio 2. Descanso y sueño / Clase 3 regulacion
B. Dominio 1. Promoción de la salud / Clase 3 autocuidado
C. Dominio 5. Autocuidado / clase 2 regulacion
D. Dominio 4. Actividad / descanso -clase 3.Balance energetico

35. Tras administrar un medicamento "x" a un paciente, este reporta náuseas. Esta reacción a pesar de solo ser una sospecha de haber sido generada por el medicamento "x", sin necesidad de confirmar la relación causal, debe reportarse en la historia clínica del paciente; porque corresponde a:
- A. Evento centinela
B. Sospecha de reacción adversa
C. Reacción bien caracterizada
D. ESAVI
36. Un centro de salud I-3 que no genera más de 10 litros al día de residuos sólidos biocontaminados y cuenta con autoclave para el tratamiento. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede almacenarlos antes de su disposición final?
- A. Un mes
B. Siete días
C. 48 horas
D. Tres días
37. En un establecimiento de salud I-4, mujer de 25 años, recibió tratamiento según esquema TB, pero indica que los síntomas continúan, y que su hija menor de 5 años, también fue diagnosticada de lo mismo. ¿Qué principio del uso de medicamentos antimicrobianos **NO** se aplica?
- A. Resistencia
B. Biodisponibilidad
C. Concentración
D. Calidad
38. En el centro de salud del primer nivel, como serumista, el registro de los datos organizados (estadística de casos) o la colecta de datos en campo (estudios de flora y fauna, vectores, entre otros) son acciones de:
- A. Salud pública
B. Vigilancia epidemiológica
C. Vigilancia centinela
D. Investigación
39. ¿Con qué se determina el número de la historia clínica de una persona de nacionalidad peruana?
- A. Carnet de extranjería
B. Pasaporte
C. Según número de ingreso
D. Documento Nacional de Identidad
40. Es un componente prioritario y esencial de los programas de inmunización y comprende el cumplimiento de un conjunto de procedimientos normalizados, estandarizados o protocolizados que se observan desde la formulación de la vacuna, su producción, transporte, almacenamiento y conservación, distribución, reconstrucción, administración (inyección segura), eliminación (bioseguridad) y la vigilancia epidemiológica e investigación de los ESAVI. ¿A qué vacuna corresponde?
- A. Vacuna regular
B. Vacuna segura
C. Vacuna inatenuada
D. Vacuna atenuada

41. Durante la vacunación casa por casa muy cerca al establecimiento de salud, una enfermera aplica la última vacuna de DT que le quedaba a una mujer de 40 años de edad. De regreso al EESS, al abrir su thermo para guardar los paquetes de hielo, visualiza que la T° registraba 10°C. ¿Qué riesgos puede padecer última mujer vacunada ante la ruptura de la cadena de frío?
- A. Disminución del número de personas susceptibles
 - B. Incremento de la eficacia de la vacuna
 - C. Presentación abscesos no sépticos**
 - D. Ganancia de la confianza de la población
42. ¿Cuál es el rango de T° en °C, necesario para la conservación de las vacunas?
- A. 1 a 8
 - B. 2 a 8**
 - C. 4 a 10
 - D. -1 a -8
43. Para garantizar el adecuado desempeño de los recursos humanos de su establecimiento de salud. ¿Qué se debe considerar?
- A. Valores
 - B. Competencias**
 - C. Virtudes
 - D. Caracteres
44. Adela es una adulta mayor viviendo con diabetes mellitus, la cual tiene dificultad para moverse. Refiere que vive con su hija que trabaja todo el día y no puede acompañarla siempre al establecimiento de salud. Está estable, pero necesita su medicación de manera oportuna. ¿Qué tipo de intervención de Telesalud requiere?
- A. Telemonitoreo**
 - B. Telecapacitación
 - C. Teleconsulta
 - D. Teleorientación
45. En las sesiones educativas a madres de familia del programa JUNTOS, manifiestan que para eliminar la anemia les dan a sus niños remolacha, hojas de berros entre otros productos de la zona. Como personal de salud. ¿Qué acciones se deben realizar para continuar las capacitaciones sin contradecir las creencias de la comunidad?
- A. Desestimar las opiniones e indicar que estos alimentos no son ricos en hierro
 - B. Retirarlos del beneficio económico del programa JUNTOS
 - C. Fortalecer el consumo de alimentos ricos en hierro, respetando sus opiniones**
 - D. obligar el consumo de alimentos ricos en hierro para evitar la anemia
46. ¿Cuál es la vacuna que se administra vía intradérmica, en la región del músculo deltoides del brazo derecho a 2 cm del acromion o vértice del hombro?
- A. APO
 - B. BCG**
 - C. Fiebre amarilla
 - D. Hepatitis B
47. Dentro del periodo prenatal. ¿Qué factor de riesgo neonatal consideramos en la evaluación de la gestante?
- A. Cesárea de emergencia
 - B. Diabetes materna**
 - C. Parto prolongado
 - D. Placenta previa

48. Mujer de 52 años, natural de región selva, trabaja en prostitución, refiere a profesional de salud que el día anterior fue dopada y sufrió agresión sexual, tiene dolor pélvico y moretones en el cuerpo, ¿Qué debe hacer el profesional de salud?
- A. Derivar a paciente para que se le brinde atención en salud mental
 - B. Aplicar kit completo de emergencia, previo consentimiento**
 - C. Aplicar kit de descarte sin consentimiento para que no se asuste
 - D. Hacer denuncia a las autoridades sin autorización de paciente
49. Se observa que hay migrantes de selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados entre los pobladores del distrito donde pernoctan, por lo que se debe ...
- A. imponer acciones socio educativas.
 - B. normalizar el comportamiento de la comunidad.
 - C. cambiar hábitos, costumbres y creencias.
 - D. reforzar la interacción cultural.**
50. Recientemente usted fue asignado a un C.S. y quiere conocer cómo se transmite una enfermedad de una persona a otra o de un reservorio no humano a una población humana, además de las razones por las que los comportamientos de riesgo causan enfermedades. ¿En qué se basa para realizar este estudio?
- A. Tanatología
 - B. Epidemiología**
 - C. Estadística
 - D. Salud pública
51. En una comunidad se reportan dos o más casos de una misma enfermedad y están relacionados entre sí, el personal de salud según criterio epidemiológico identifica que es:
- A. Pandemia
 - B. Brote**
 - C. Endemia
 - D. Epidemia
52. En un establecimiento de salud, acude mujer de 25 años, indicando que su pareja la obligó a ver "material pornográfico", el médico que la atiende brinda atención integral y requiere registrarla en su HIS. Este acontecimiento esta tipificado como:
- A. Abuso sexual
 - C. Violencia sexual**
 - B. Agresión física
 - D. Violencia de género
53. Gestante de 8 semanas de 36 años, refiere ser violentada sexualmente por su pareja, acude al servicio a solicitar apoyo. Como profesional de la salud se debe indicar que la gestante realice su denuncia en primera instancia a la:
- A. Ministerio de la mujer
 - D. Fiscalía de familia**
 - B. Policía del sector
 - C. Centro de emergencia mujer
54. En un establecimiento de salud I-4, un ejemplo de UPSS podría considerarse al servicio de ...
- A. docencia.
 - C. pediatría.**
 - B. gestión de investigación.
 - D. epidemiología.

55. Paciente migrante con tuberculosis pulmonar acude al establecimiento de salud solicitando ser atendido en el programa de PCT, no cuenta con documento de identificación. ¿Cuál es el procedimiento para solucionar el problema y brindar una atención adecuada y oportuna?
- A. Por estrategia sanitaria no requiere documento
 - B. Referir a migraciones con el diagnóstico de TB**
 - C. Solicitar la exoneración del tratamiento
 - D. Exigir su inscripción al SIS por enfermedad infecto contagiosa
56. En el establecimiento de salud I-4, acude paciente con tratamiento de sífilis. Para la clasificación de la etapa clínica y diagnóstico de neurosífilis. ¿Cuál es la prueba indicada?
- A. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)**
 - B. FTA Abs (Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption)
 - C. TPPA (Treponema pallidum particle agglutination)
 - D. TPHA (Treponema pallidum Haemagglutination)
57. Si un adulto recibió las 3 dosis de vacunación completa de la difteria y tétanos, a los cuantos años después debe reforzar la inmunidad con una sola dosis?
- A. 15
 - B. 10**
 - C. 20
 - D. 5
58. Los factores que afectan a la salud son múltiples, y las relaciones entre ellos, complejas. Los determinantes sociales, definidos como las condiciones en las que viven las personas y a sus experiencias sociales que tienen un efecto sobre su salud, tienen los siguientes componentes:
- A. Etnia - factores biológicos
 - C. Estructurales - intermedios**
 - B. Posición socioeconómica- genética
 - D. Socioeconómicos - interculturales
59. Se realiza la visita a un niño con anemia, se le orienta a la madre darle alimentos ricos en hierro como la sangrecita. La madre señala que su religión no le permite. ¿Cuál es la conducta más adecuada para mejorar el estado de salud del menor?
- A. Respetar la decisión y creencia de la familia
 - B. Fortalecer el consumo de hierro intradomiciliario**
 - C. Llamarle la atención por negligencia y desidia
 - D. Obligar a que la madre lo alimente con la sangrecita
60. En la comunidad, se identifican a niños <1 año sin vacunas, sin CRED y sin tamizaje de anemia. Se les brinda orientación y consejería a las madres de la importancia de cumplir con el calendario de atención integral de salud de los menores, quienes responden que no tienen tiempo para llevarlos al centro de salud. ¿Qué estrategias se deben realizar para sensibilizar y promover el cuidado integral de salud de los infantes?
- A. Comunicar a las autoridades por exposición al peligro de los menores
 - B. Organizar un plan de visitas por el equipo multidisciplinario
 - C. Hacer de conocimiento a la fiscalía de la familia
 - D. Captar y capacitar a líderes comunales para las visitas continuas**

61. En un establecimiento de primer nivel de atención detectamos un caso de tamizaje positivo de TBC pero el paciente tiene el diagnóstico de problemas de salud mental ,donde se debe derivar?
- A. Hospital psiquiátrico
 - B. Centro de salud mental y comunitaria**
 - C. Considerar como un paciente altamente de riesgo
 - D. Establecimiento de salud de mas complejidad
62. ¿Cuál es la función esencial que ha sido identificada como critica para la práctica de la salud publica relacionada a la colaboración activa del personal de los servicios de salud en el desarrollo de programas educativos en la comunidad?
- A. Participación social
 - B. Promoción de la salud**
 - C. Regulación y fiscalización
 - D. Promoción del acceso equitativo
63. La búsqueda intencionada y sistemática de casos de dislipidemia y obesidad infantil en las historias clínicas y archivos estadísticos del centro de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. Activa
 - C. Pasiva**
 - B. Centinela
 - D. Retrospectiva
64. La tendencia del crecimiento y peso de una niña que acude a su control de CRED no se encuentran paralelos al patrón de referencia, esto se ha visualizado con respecto a su control anterior. En esta situación. ¿Cómo es su crecimiento?
- A. Inadecuado**
 - C. Logrado
 - B. Adecuado
 - D. Esperado
65. Adolescente de iniciales J.P.C. de 14 años, tiene autismo moderado, hace 3 años dejó la medicación, en los últimos meses tiene conducta agresiva con la comunidad (vecinos y colegio), mamá refiere "no es colérico en casa, pero tiene actitud negativista y aptitud apática, rechaza a la gente ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica NANDA priorizada para iniciar la intervención primaria de vida adolescente?
- A. Deterioro de la regulación del estado de ánimo
 - B. Interacción social deteriorada**
 - C. Gestión ineficaz de la salud comunitaria
 - D. Conectividad social deteriorada
66. En una comunidad amazónica se registra un brote de malaria por *Plasmodium falciparum*, donde dos niños fallecieron de un total de 50 pacientes (4%) confirmados con gota gruesa y PCR. ¿Cuál es la medida epidemiológica de frecuencia referida?
- A. Tasa de ataque
 - B. Tasa de letalidad**
 - C. Incidencia acumulada
 - D. Tasa de mortalidad general
67. Se encuentra atendiendo el serumista profesional de salud no médico en un establecimiento de salud nivel I-1. ¿Cuál es la atención de salud de urgencia prioritaria que debe referir?
- A. Parasitosis intestinal
 - D. Síndrome febril**
 - B. Hemorragia leve
 - C. Asma no complicada

68. Juana y Gregorio acuden al centro de salud para recibir orientación por personal capacitado en ITS, al finalizar la sesión, les proveen preservativos masculinos y condones femeninos en un número de respectivamente.
- A. 20 y 30
B. 20 y 10
C. 60 y 20
D. 30 y 10
69. Es una estrategia de intervención que consiste en la indicación y la entrega de los micronutrientes o hierro (en forma de sulfato ferroso o complejo polimaltosado ferrico) con la finalidad de prevenir la anemia por deficiencia de hierro, ¿quién es el profesional que prescribe?
- A. El profesional de salud médico
B. El profesional de salud en general
C. El profesional de salud nutricionista
D. El profesional de salud que realiza el control de la niña o niño
70. El jefe del puesto de salud acudió a la reunión convocada por el municipio para empadronamiento y evaluación sanitaria de los drogadictos que pernoctan a las afueras de la ciudad y que han ido en aumento. Este hábito negativo para la salud, está dentro del grupo de determinantes:
- A. Biológicos
B. Ambientales
C. Asistenciales
D. Genéticos
71. Cerca al centro de salud de primer nivel, existe una tienda de abarrotes que vende medicamentos, a la que acuden los pacientes. Las fechas de expiración de dichos medicamentos están dentro del rango apropiado y no se observa indicios de ser de dudosa procedencia, según comenta un poblador. Según la "Política Nacional de Medicamentos" se debe:
- A. Verificar periódicamente las fechas de vencimiento
B. Velar por precios asequibles de medicamentos
C. Formalizar dicho comercio
D. Erradicar el comercio informal
72. El enfoque intercultural implica que el estado valore e incorpore las diferentes visiones grupos étnico culturales para la generación de los servicios con pertinencia cultural, promoviendo el reconocimiento de la ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada. Estos enfoques deberían ser diferenciados de manera especial en los.
- A. Pueblos latinos y europeos
B. Pueblos indígenas y población afroperuana
C. Población en general
D. Pueblos aymaras e indígenas
73. Ud. desea definir las líneas de mejora continua de su centro de salud para lo cual es necesario conocer sus fortalezas. ¿Qué pregunta debe realizar?
- A. ¿Qué se está haciendo bien?
B. ¿Qué facilidades se presentan?
C. ¿Qué nos falta para mejorar?
D. ¿Qué riesgos externos existen?

74. El tabaco es un factor de riesgo para cáncer pulmonar y EPOC, una intervención efectiva para disminuir la exposición es la implementación de medidas correctivas que favorezcan espacios libres de humo, siendo una función de salud...
- A. individual.
 - B. familiar.
 - C. pública.
 - D. participativa.
75. La Enfermera según su norma técnica tiene visita de seguimiento de casos inconclusos del plan de atención de salud para adolescentes, determina la visita en al menos visitas para conocer el entorno personal, social y familiar saludable.
- A. 3
 - B. 2
 - C. 5
 - D. 4
76. NT de prevención y control de anemia del niño(a) menor de 36 meses en diagnóstico situacional de hb baja, habiendo tenido un diagnóstico de enfermería “dinámica ineficaz de la alimentación infantil relacionado a estreñimiento, en la efectividad del suplemento de hierro, la recomendación es:
- A. Cambie el horario de las gotas y fraccione la dosis indicada
 - B. Dele lactancia materna seguida y fraccione la dosis en 2 tomas
 - C. No se preocupe, las gotas cambian el color de las deposiciones
 - D. Mezcle el suplemento con un poco de agua o jugo de frutas
77. En la comunidad de un PS I-2 se identifica que existe un número elevado de adolescentes entre 13 y 15 años que se encuentran laborando pasteando ganado y pernoctando en el campo y que no han sido matriculados en la escuela. ¿A qué determinantes corresponde esta situación?
- A. Estilo de vida
 - B. Intermedios
 - C. Ambientales
 - D. Estructurales
78. Los migrantes de la selva que viven en una comunidad de Lima, mantienen sus estilos de vida donde prevalece el trabajo informal, la deserción escolar y el ausentismo en servicios de salud, por lo que se debe realizar ...
- A. brindar solamente acceso a los diversos programas sociales.
 - B. censo a fin de conocer las personas que se encuentran en riesgo de salud.
 - C. gestionar políticas públicas que brinden recursos en la comunidad.
 - D. visitas domiciliarias a fin de integrarlos a los servicios de salud.
79. Para prevenir las muertes neonatales institucionales, la población de las zonas rurales por costumbre y cultura prefieren los partos intradomiciliarios. ¿Qué acciones se deben de tomar en cuenta para cumplir con los objetivos del sector al impulsar el parto?
- A. Prometer la entrega de canastas de víveres
 - B. Educación vivencial de participación comunitaria
 - C. Informar a las gestantes que la atención es gratuita
 - D. Atender los partos intradomiciliarios

80. En el PS I-2 de la región central se ha detectado un caso de fiebre amarilla selvática, en este caso la notificación es:
A. Semanal
B. Mensual
C. Inmediata
D. Quincenal
81. En el Cs San Cosme una de las acciones para diagnóstico de la Depresión es realizar tamizaje a personas mayores de 18 años a lo cual se realiza prioritariamente en los servicios de ...
A. crecimiento y desarrollo.
B. odontología.
C. consulta externa.
D. nutrición.
82. Se desea ordenar el servicio de Admisión en un establecimiento de salud. ¿Hasta cuántos años de la última consulta se pueden tener las historias clínicas en el archivo activo?
A. 2
B. 3
C. 10
D. 5
83. Usted acaba de ganar su plaza SERUMS, y en su primer día de trabajo, su jefatura le indica que se encuentran en el proceso de búsqueda de información a fin de elaborar el documento que oriente una gestión eficiente en salud acorde con los procesos de planificación. ¿Cuál es el documento?
A. Análisis de Situación de Salud
B. Análisis Global del Estado de la Salud
C. Análisis Global de los Determinantes de la Salud
D. Análisis de la Vulnerabilidad territorial
84. En una comunidad de la selva del Perú, sólo los casos de mordeduras por serpientes venenosas y no venenosas se reportan ...
A. Probable y confirmado / inmediatamente.
B. Probable y confirmado / semanalmente.
C. Sospechoso, probable y confirmado / inmediatamente.
D. Confirmado / semanalmente.
85. Personal de enfermería de I-2, se dispone a la preparación de una vacuna con el uso de polvo liofilizado que requiere constitución con cloruro de sodio al 0.9%. ¿Qué característica de la vacuna aplica?
A. Composición
B. Presentación
C. Conservación
D. Dosis
86. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutoria corresponde a:
A. Atención primaria
B. Contrarreferencia
C. Referencia
D. Atención compartida

87. En una comunidad con escenario de intervención III para *Aedes aegypti* se realizaron actividades de vigilancia mediante ovitrampas, obteniendo un índice IPO/IDH de 70. ¿Qué medidas se debe adoptar, considerando la estratificación del riesgo entomológico?
- A. Identificar criaderos para eliminar
B. Aplicar larvicidas y adulticidas
C. Realizar inspecciones adicionales
D. Seguir con el monitoreo
88. Una persona después de haberse vacunado contra el dengue. ¿Cuánto tiempo debe permanecer en el área de reposo?
- A. Una hora
B. 30 minutos
C. 45 minutos
D. 2 horas
89. Se apersona una mujer de 25 años, al establecimiento de salud, con 20 semanas de gestación, sin controles previos, de acuerdo a protocolo le realizan los exámenes de VIH, con resultados positivo. ¿Qué acciones se realizan desde el centro de salud nivel I-3?
- A. Control de gestación y psicoprofilaxis
B. Derivación a centro hospitalario para recibir retrovirales
C. Ubicación de familiares para soporte socio familiar
D. Gestionar apoyo con programa social del MIDIS
90. En un establecimiento de salud I-4, ingresa paciente con parto inminente, no controlada. ¿Cuál de las siguientes pruebas de tamizaje rápido se utiliza para detectar anticuerpos contra VIH y treponema pallidum o anticuerpos treponémicos totales?
- A. PRT (pruebas rápidas triples)
B. PRD (pruebas rápidas duales)
C. FTA-Abs
D. PM (pruebas moleculares)
91. En un establecimiento de salud I-4 el personal de salud está organizado para identificar problemas de salud, facilitando el control y resolución de los mismos en su comunidad. ¿Qué estrategia han implementado?
- A. Gestión por procesos
B. Presupuesto por resultados
C. Vigilancia epidemiológica
D. Oferta de servicios
92. En el EESS Conde de la vega acude un varón de 72 años al cual la enfermera determina su condición clínica, su estado físico, emocional y cognitivo, así como su situación socioeconómica. ¿Qué acciones viene aplicando dentro del cuidado integral de salud?
- A. Valoración clínica del adulto mayor
B. Mini valoración nutricional
C. Consejería integral de salud
D. Tamizaje de salud
93. Paciente migrante de la zona alto andina llega al establecimiento de salud I-3, solicitando una referencia al hospital, por incapacidad motora. El SIS de la paciente es de provincia. ¿Qué acciones se debe realizar para solucionar el requerimiento de la paciente?
- A. Que regrese a su lugar de origen para su referencia
B. Hacer su referencia para una atención inmediata
C. Negarle la atención por no tener HC en el establecimiento
D. Coordinar y gestionar con los responsables del SIS central

94. El establecimiento I-3 de una comunidad se encuentra celebrando su aniversario, por lo cual limitó el número de atenciones a los usuarios de los servicios de salud, generando malestar en ellos. En relación a la Atención Primaria en Salud ¿Qué atributo se está afectando?
- A. Integralidad
B. Accesibilidad
C. Coordinación
D. Longitudinalidad
95. Neonato de 8 horas de parto domiciliario, en zona rural. Deben recibir BCG y HvB. ¿Cuál es el tiempo ideal para recibirlas?
- A. Dentro de las 24 horas**
B. Hasta un año
C. Dentro de una semana
D. Hasta un mes
96. En un centro de salud I-4, el nuevo médico jefe ha reestructurado el rol central de esta institución, la población objetivo asignada y los atributos de la entidad. Esta construcción de elementos se denomina:
- A. Indicador
B. Misión
C. Objetivo
D. Visión
97. Recién nacida de parto eutócico con bajo peso (2kg) debe recibir sus vacunas de acuerdo a calendario de vacunación para su edad. ¿Qué vacunas le corresponden recibir antes del alta?
- A. Vacuna combinada hexavalente
B. Vacuna antipolio inactivada
C. Vacuna combinada pentavalente
D. BGG (antituberculosis) y HvB (antihepatitis)
98. Durante la atención integral de la gestante, los controles prenatales buscan detectar riesgos para eliminarlos o minimizarlos. ¿Qué tipo de prevención es?
- A. Secundaria
B. Cuaternaria
C. Primaria
D. Terciaria
99. Para realizar un trabajo de investigación y obtener información de las exposiciones anteriores y actuales. ¿Qué tipo de recolección de debe realizar?
- A. Informante
B. Instrumento
C. Observación
D. Entrevista
100. Un estudio de investigación realizado en una población aledaña a su centro de salud, reporta que los niños cuya familia es monoparental tiene el doble de riesgo de presentar anemia ($RR=2.0$), respecto a aquellos con familia biparental. ¿Cuál es el tipo de medida epidemiológica a la que se hace referencia?
- A. Frecuencia
B. Asociación
C. Mortalidad
D. Impacto